



# VELD GRAZER 128

PROTEÏEN MINERAAL SPOORMINERAAL VITAMIEËN KONSENTRAAT VIR  
SELFMEENG VAN DROË SEISOEN LEKKE

## SLUUTEL VOORDELE

- Hoogs gekonsentreerd – maak maksimale gebruik van eie / lokale grondstowwe
- Veeldoelig – meng onderhoudslekke, proteïenlekke, produksielekke, energielekke en ooi & lam lekke
- Hoë vlakke Fosfor en Magnesium – verbeter speenmassa & konsepsie
- Hoë vlak Vitamiene A en E – verbeter vrugbaarheid & gesondheid

## VOORBEELDE VAN LEKKE VIR BEESTE

| GRONDSTOWWE                    | ONDERHOUDS LEK | PROTEÏEN LEK | PRODUKSIE LEK | ENERGIE LEK |
|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Graanmeel / Hominy Chop        | 300            | 400          | 600           | 750         |
| Sout                           | 400            | 350          | 250           | 150         |
| Veld Grazer 128                | 300            | 250          | 150           | 100         |
| Totaal (kg)                    | 1000           | 1000         | 1000          | 1000        |
| Samestelling (%)               |                |              |               |             |
| Proteïen                       | 40,9           | 35,3         | 24,0          | 18,8        |
| Proteïen ex NPN (% van totaal) | 94,1           | 90,9         | 80,0          | 68,1        |
| Energie (MJ ME / kg)           | 3,7            | 5,0          | 7,4           | 9,3         |
| Kalsium                        | 3,95           | 3,29         | 1,98          | 1,33        |
| Fosfaat                        | 1,51           | 1,30         | 0,87          | 0,67        |
| Inname – Beeste (g / dag)      | 400 - 600      | 500 - 700    | 700 - 1000    | 1000 - 1500 |
| Toepassing van lekke           | Droog          | Dragtig      | Laktasie      | Uitgroeï    |

## VOORBEELDE VAN LEKKE VIR KLEINVEE

| GRONDSTOWWE                    | PROTEÏEN LEK | PRODUKSIE LEK | ENERGIE LEK        | OOI & LAM LEK |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| Graanmeel / Hominy Chop        | 400          | 550           | 650                | 725           |
| Oliekoekmeel                   | 100          | 100           | 100                | 100           |
| Sout                           | 300          | 200           | 150                | 100           |
| Veld Grazer 128                | 200          | 150           | 100                | 75            |
| Totaal (kg)                    | 1000         | 1000          | 1000               | 1000          |
| Samestelling (%)               |              |               |                    |               |
| Proteïen                       | 32,5         | 27,3          | 21,7               | 19,1          |
| Proteïen ex NPN (% van totaal) | 78,9         | 70,5          | 59,2               | 50,5          |
| Energie (MJ ME / kg)           | 6,0          | 7,9           | 9,1                | 10,0          |
| Kalsium                        | 2,70         | 2,00          | 1,37               | 1,04          |
| Fosfaat                        | 1,16         | 0,96          | 0,74               | 0,64          |
| Inname – Kleinvee (g / dag)    | 100 - 150    | 150 - 200     | 200 - 300          | 300 - 500     |
| Toepassing van lekke           | Droog        | Dragtig       | Uitgroeï / Prikkel | Laktasie      |

## VOERAANBEVELINGS

- Vervang tot 10 % van die graanmeel met ekstra sout vir die eerste 10 tot 14 dae vir aanpassing
- Daarna word die bes gereguleerde innames verkry deur lekke ten alle tye onbeperk te verskaf
- Sout insluiting dien as 'n riglyn – dit mag verskil ten opsigte van veld tipe en toestande
- Verskaf lekke na gelang van reproduksie stadium, kwaliteit van weiding en ligamenskondisie van diere
- Goeie kwaliteit, voldoende weiding en / of ruvoer moet te alle tye saam met hierdie lekke beskikbaar wees
- Vervang tot 10 % van die graanmeel met melassemeel of –stroop indien verkies
- Vir jonger beeste word dit aanbeveel dat 50 kg graanmeel met oliekoekmeel vervang word
- Raadpleeg 'n Feedtek voedingskundige indien werklike innames na 14 dae verskil van aanbevole innames
- Hierdie lekke bevat NPN – meng deeglik, beskerm teen reën en moenie aan perde en wild voer nie

